

# Absolute® 60 SC

Spinetoram 60 g/L



<b>Formulación</b>	: Suspensión Concentrada.
<b>Modo de Acción</b>	: Actúa por contacto e ingestión.
<b>Mecanismo de Acción</b>	: Efecto neurotóxico sobre insectos.
<b>Toxicidad</b>	: Ligeramente Peligroso.
<b>Grupo Químico</b>	: Spinosoides.

## PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Insecticida con un efecto de control rápido y contundente sobre larvas de lepidópteros, dípteros y trips en los cultivos de maíz y cebolla. Es selectivo a los insectos benéficos, lo que lo convierte en una excelente herramienta para el manejo integrado de plagas.

### Indicaciones de Uso

Aplicar siguiendo las recomendaciones de un Ingeniero Agrónomo, de acuerdo al grado de infestación y el daño generado en el cultivo. Llenar el tanque hasta la mitad con agua y agregar Absolute 60 SC agitando continuamente. Agregar el resto de agua agitando.

Aplicar en forma de aspersión con la cantidad suficiente de agua para cubrir uniformemente el follaje de las plantas según las dosis indicadas en la etiqueta.

No efectuar más de tres aplicaciones por año. Se debe aplicar utilizando aspersora manual de mochila. Usar suficiente agua para asegurar un buen cubrimiento. No presenta incompatibilidad conocida. Posee buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados, siguiendo las indicaciones de uso. Tóxico para abejas.

### Primeros Auxilios

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico, muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

En caso de contacto con los ojos, se deben mantener abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua por 15-20 minutos. Remueva los lentes de contacto, si los tiene, después de los primeros 5 minutos. Posteriormente continúe con el lavado de los ojos.

En caso de contacto con la piel, debe quitarse la ropa contaminada. Lavar la piel inmediatamente con bastante cantidad de agua por 15-20 minutos.

En caso de ingestión, se debe beber un vaso de agua, si está en capacidad de deglutir. No induzca el vómito a menos que un centro de control de intoxicaciones o un médico dé la indicación. Nunca dé cosa alguna por la boca a una persona inconsciente.

En caso de inhalación, se debe trasladar al paciente al aire fresco. Si la persona no respira, llamar a un servicio de respuesta de emergencia o ambulancia, y administrar respiración artificial; si es boca a boca utilizar protección para rescatista (mascara de bolsillo etc.).

**Indicaciones para el médico:** El tratamiento de la exposición debe estar dirigido al control de los síntomas y la condición clínica del paciente.

**Antídoto:** No existe antídoto específico.



# Absolute® 60 SC

Spinetoram 60 g/L



## Recomendaciones de Uso

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS	PC* (días)	LMR** (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO	L/ha		
Brocoli	Plutella	<i>Plutella xylostella</i>	0.1	1	0.05
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.3	1	0.10
Espárrago	Gusano Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.25	-	0.04
Maíz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.075 - 0.1	1	0.04
Pimiento	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.15	1	0.4
Vid	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.3	7	0.5
Espárrago	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.25	-	0.04
Palto	Bicho del cesto	<i>Oiketicus kirbyi</i>	0.3	1	0.3
Alcachofa	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	0.15	2	0.3
Algodón	Gusano bellotero	<i>Heliothis virescens</i>	0.15	28	15
Arándanos	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	0.25	3	0.04
Mandarina	Minador de los cítricos	<i>Phyllocnistis citrella</i>	0.3	1	0.3
Pimiento	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.25	1	0.4
Papa	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.25	1	0,1
Granado	Polilla de la mazorca	<i>Tallula atramentalis</i>	0.3	1	0,3

\*PC=Periodo de carencia (días)

\*\*LMR=Límite Máximo de Residuos (ppm)

### Envases

: Frasco x 250ml  
Frasco x 1 L  
Galonera x 4 L

### Número de Registro

: PQUA N°206-SENASA

