



TRAUCO®

Reg. PQUA N° 1489 – SENASA

FORMULACIÓN

TRAUCO es un herbicida pre y post emergente temprano, formulado en Concentrado Emulsionable (EC), que contiene 240 g de Oxyfluorfen por litro de producto formulado.

GRUPO QUÍMICO

Difenil éter

CARACTERÍSTICAS GENERALES

TRAUCO es un herbicida pre y post emergente temprano para control de malezas de hoja ancha, algunas gramíneas y ciperáceas. Brinda un largo efecto residual que permite mantener el cultivo limpio durante el periodo crítico de competencia de malezas. Se obtienen buenos resultados en post emergencia, cuando la maleza tiene máximo 4 hojas verdaderas, según lo indicado en la etiqueta para el cultivo en particular.

MODO DE ACCIÓN

TRAUCO actúa por contacto, tiene efecto residual. Es absorbido más rápidamente por las hojas, en especial por brotes, y no tanto por las raíces. Actúa en la inhibición del protoporfirinógeno oxidasa (PPO), enzima de los cloroplastos que al oxidar impide producir protoporfirina IX. Este producto es importante ya que es la molécula precursora de las clorofilas (necesarias para la fotosíntesis) y los grupos hemo (necesarios en las cadenas de transferencia de electrones).



CUADRO DE USOS

CULTIVO	P L A G A S		DOSIS (L/Ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
CEBOLLA	“Nabo silvestre”	<i>Brassica campestris</i>	0.5 - 0.75	45	0.05
	“Paico”	<i>Chenopodium album</i>			
	“Trébol blanco”	<i>Trifolium repens</i>			
	“Amor seco”	<i>Bidens pilosa</i>			
	“Tomatillo”	<i>Solanum pimpinellifolium</i>			
	“Pata de Gallina”	<i>Eleusine indica</i>			
CACAO	“Oreja de ratón”	<i>Commelina erecta</i>	4	1	0.05
	“Digitalis”	<i>Digitalis sanguinalis</i>			
	“Cortadera”	<i>Cyperus ferax</i>			

PC: Periodo de Carencia en días.

LMR: Límites máximos de Residuos en ppm.

RECOMENDACIONES

- Se aplica solo una vez por campaña por año.
- En aplicaciones pre emergentes, no remueva el suelo por 3 semanas.
- Las aplicaciones post emergentes realícelas cuando las malezas tengan 4 hoja o 10 cm. de altura.
- Use suficiente volumen de agua, 400 - 500 litros/hectárea, para garantizar una buena cobertura a las malezas.

COMPATIBILIDAD

TRAUCO es incompatible con agentes oxidantes o reductores cuyos pHs sean mayores a 10 o menores a 3.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada antes de 24 horas transcurridas desde la aplicación.

SEGURIDAD

- No es inflamable, no es explosivo, no es corrosivo.
- Es ligeramente peligroso – cuidado por lo que tiene banda de seguridad color azul.
- Para el manejo y uso debe utilizarse ropa e implementos de protección personal.